

Comment conduire le traitement en vue d'une réduction de consommation?

Docteur Thomas ORBAN



SOCIETE SCIENTIFIQUE de
MEDECINE GENERALE

Bruxelles, le 23 février 2018


Liens d'intérêt

Le travail de la commission alcoologie a été soutenu par:

- SPF Santé Publique (2012)
- Lundbeck (2011- 2013)
- Conseil National de Promotion de la Qualité (CNPQ) (2013)
- COFOF, RW (2014-16)

LA DÉPENDANCE À L'ALCOOL EST FRÉQUENTE MAIS ELLE EST RAREMENT DIAGNOSTIQUÉE

En 2001, environnment
228.900
BELGES (18-64y) ONT UNE
DÉPENDANCE à l'ALCOOL¹⁰
Hommes 5,4 %
Femmes 1,9 %



15%
SONT DIAGNOSTIQUÉS¹¹

8% SONT EFFECTIVEMENT
TRAITÉS¹²

i Treatment Gap

Objectifs de consommations

< 14-21 UA / sem

Toute réduction est importante et positive

Plus on part de haut, plus l'impact est grand

Ex: 36 g d'alcool par jour en moins : réduction 3X plus importante si on part de 96g/j plutôt que 60!

Stratégies

